

غالب على بوروي

الجمهورية العربية الليبية الاشتراكية العظمى  
مركز بحوث الأحياء البحرية  
ص . ب . 30830 تاجوراء

①

# دليل مصور لبعض الأسماك الإقتصادية بمياه الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

إعداد  
شعبة الأسماك

تم الإعداد الفنى و الطباعة بدار ادفرا - باريس

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية 1990 م

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة  
مكتبتي الخاصة  
على موقع ارشيف الانترنت  
الرابط

[https://archive.org/details/@hassan\\_ibrahem](https://archive.org/details/@hassan_ibrahem)

@j • KDe&@^È ! \* È ^ @ • ED @e • æ ' ã | æ @ {

## تقديم

مساهمةً من مركز بحوث الأحياء البحرية فى التوعية العلمية للجماهير العريضة المدعوة إلى ارتياد البحر و سواحله و مزاولة صيد الأسماك سواء لأغراض الهواية أو الاحتراف ، وإدراكاً منه لأهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه كل مواطن تجاه الاستثمار الأمثل لهذه الموارد الحية المتجددة من خلال اتباع الطرق و الأدوات التى تتناسب مع صيد كل نوع منها ، و تحاشى صيدها فى مواسم ومواطن تكاثرها ، إلى جانب المحافظة على بيئتها البحرية من مخاطر التلوث و عواقبه ، فى سبيل ذلك كان قد صدر عن المركز « دليل للتعرف على الأسماك الغضروفية فى البحر المتوسط » وهو يقدم اليوم هذا الدليل المصور لبعض أنواع الأسماك التى تزخر بها مياه السواحل البحرية للجماهير العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .

إن هذا الدليل يمد القارئ الكريم بمعلومات هامة مبسطة حول هوية و بيولوجية هذه الأنواع السمكية و طرق صيدها . و نود الإشارة إلى أن المركز يعكف على إصدار ملاحق لهذا الدليل سعياً منه إلى تكملة جرد كافة أنواع الأسماك و الرخويات و القشريات و غيرها من الأحياء البحرية الأخرى بمياه الجماهيرية العظمى تحقيقاً لأحد الأغراض الواردة فى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1582) لسنة 81 م القاضى بإنشاء مركز بحوث الأحياء البحرية . و الله ولى التوفيق .

د. عتيق العربي الهونى

أمين عام مركز بحوث الأحياء البحرية

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة  
مكتبتي الخاصة  
على موقع ارشيف الانترنت  
الرابط

[https://archive.org/details/@hassan\\_ibrahem](https://archive.org/details/@hassan_ibrahem)

© 2015 Hassan Ibrahim. All rights reserved.

## مقدمة

سعيًا من مركز بحوث الأحياء البحرية إلى إيجاد تعريفات علمية صحيحة لكل نوع من أنواع الأسماك وكافة الأحياء البحرية وصياغتها في دليل عملي يكون أداةً للتعريف السريع على تلك الأسماك وغيرها من الكائنات البحرية بحيث يسهل استعماله من قبل المهتمين بقطاع الثروة السمكية سواء من حيث الدراسة والبحث ، أو من حيث التخطيط والإدارة ، أو على الصعيد التنفيذي في مجال صيد الأسماك (هواية أو احترافاً) وتسويقها وتصنيعها ، أو مجرد الصيد والاستهلاك المباشر . من أجل ذلك وإلى هؤلاء جميعاً نقدم هذا الدليل المصور الذي يتيح بساطة التعرف على بعض الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية في مياه الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى من البحر المتوسط .

يحتوى الدليل على رسومات مصورة لتسعة وتسعين نوعاً من الأسماك العظمية والغضروفية تنتمى إلى أربعين عائلة . وقد خصص لكل نوع من هذه الأنواع ورقة منفردة وذلك بغية تيسير الاستعمال اليومي لهذا الدليل . وقد ضمنا الإسم العلمي (اللاتينى) والإسم العربى أو الإسم المحلى لكل نوع ، مع نبذة مختصرة عن البيئة التى يقطنها والغذاء الذى يعيش عليه ، ومدى حجمه الممكن ، ومواسم تكاثره ثم الطرق المتبعة فى صيده . واستعنا فى إعداد هذا الدليل بأحدث الكتب والتقارير الصادرة عن كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو : 1986 و 1987) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو : 1988) إلى جانب عدد من التقارير الأخرى . ونأمل أن يحقق هذا الدليل الغرض الذى أعد من أجله كما نأمل أن يكون فى هذا العمل مساهمةً فى إثراء المكتبة العربية بالكتب المتخصصة فى مجالات علوم الحياة البحرية . والله ولى التوفيق .



## المحتويات

### الصفحة

### عائلة ثونيدى

- 13 تونة زرقاء الزعنفة .  
 15 تونة صفراء الزعنفة .  
 17 تونة طويلة الزعنفة (البكور) .  
 19 التونة الوثابة (سكيب جاك) .  
 21 التونة الصغيرة (رزام منقط) .  
 23 التونة الفرقاطة (رزام عادى) .

### عائلة سكومبرورىدى

- 25 البلاميط (بونيتو) .  
 27 البلاميط المخطط (بونيتو) .

### عائلة زيفيدى

- 29 أبو سيف .

### عائلة سكومبرىدى

- 31 الحصان (كواللى) .  
 33 الحصان (كواللى) .

### عائلة كوروفينيدى

- 35 سمكة الدلفين (اللمبوكة) .

### عائلة كلوبيدى

- 37 السردينية .  
 39 السردينية .  
 41 السردينية .  
 43 اللوزة .

### عائلة انقروليدى

- 45 الأنشوقة .

عائلة كارانجيدى

عائلة ميرلوسيدى

عائلة قاديدى

عائلة ميوجليدي



## الصفحة

### عائلة مورونيدى

85

القاروص العادي .

87

القاروص المنقط .

### عائلة ميولليدى

89

السلطان إبراهيم (تريليا حجر) .

91

السلطان إبراهيم (تريليا رمل) .

### عائلة سباريدى

93

المرجان العادى (باقرو) .

95

مرجان النقط الزرقاء (باقرو) .

97

المرجان البرنزى (بازوكا) .

99

المرجان بوعين .

101

المرجان الأحمر .

103

العضاض (جفالى) .

105

العضاض (دندشى) .

107

الدنيس (أوراتا) .

109

القراقوز الموشم .

111

المنكوس .

113

الكحلة .

115

الحمراية .

117

التنوت .

119

الشلبة .

121

الموزة (البوقة) .

### عائلة سكوربينيدى

123

العقرب الأحمر (شكورفو) .

125

العقرب الأسود (شكورفو) .

127

العقرب الصخرى (شكورفو) .

## الصفحة

### عائلة تريقليدي

- 129 الدجاجة .  
131 الدجاجة .  
133 الدجاجة .  
135 الدجاجة .

### عائلة سيانيدى

- 137 البغلة .  
139 الغراب .

### عائلة لوفبيدي

- 141 ابوشص (جرانة) .

### عائلة يورانوسكوبيدي

- 143 البومة (بلم) .

### عائلة زيدي

- 145 المرايا (سان بييترو) .

### عائلة بوماتوميدي

- 147 المياس (سيرا) .

### عائلة تراكيندي

- 149 التّراخين المنقط (تراجنا) .

### عائلة سرانيدى

- 151 الفروج (دوت) .  
153 المتّاني (فروج أكحل) .  
155 المتّاني .  
157 السرّان .

159 البَرَاكِش (القَبْرُون) .

عائلة لايريدي

160 الخَضِير (أبو خَضِير) .

161 العَرِيْسة .

عائلة سينتراكانثدي

163 أبوزمارة (زَمِيمرة) .

165 الزريقة .

عائلة براميدي

167 الكستنائية (قصطة) .

عائلة لوفاريدي

169 الكوة (الامبراطور) .

عائلة سوليدي

171 سمك مُوسى (مَداس) .

173 سمك مُوسى (مَداس) .

175 سمك مُوسى (مَداس) .

179 سمك مُوسى (مَداس) .

عائلة بوثيدي

181 سمك مُوسى (مَداس) .

183 سمك مُوسى (مَداس) .

عائلة سكونثلميدي

185 سمك مُوسى (مَداس) .


187 سمك مُوسى (مَداس) .

189 سمك مُوسى/تَرْبُوت (مَداس) .



FAMILY : THUNNIDAE

عائلة : ثونّيدي



الإسم المحلي : تونة زرقاء الزعنفة

الإسم العلمي : ثنّاس ثنّاس

*Thunnus thynnus*

الإسم الإنجليزي : بلوفين تونا

*Bluefin tuna*

## تونة زرقاء الزعنفة

**المعيشة :** عائمة بالمياه العليا ، تعيش في مجموعات بالمياه الباردة ، ومهاجرة إلى المياه الدافئة القريبة من السواحل .

**الغذاء :** القشريات ، الرخويات ، وأسماك السردين والأنشوجة .


**موسم التكاثر :** شهرا الصيف (يونيو) و ناصر (يوليو)

**الحجم :** 50 – 300 سم

**طرق الصيد :** التُّنَّارة ، الخيط الطويل (برنقالي) ، وشباك الإحاطة (التحليق) .

FAMILY : THUNNIDAE

عائلة : ثونّيدي



الإسم المحلي : تونة صفراء الزعنفة

الإسم العلمي : ثناس ألباكارس

*Thunnus albacares*

الإسم الإنجليزي : يلوفاين تونا

*Yellowfin tuna*

## تونة صفراء الزعنفة

**المعيشة :** عائمة بالمياه العليا ، تعيش في مجموعات بالمياه الدافئة القريبة من السواحل .

**الغذاء :** القشريات ، الرخويات ، وأسماك السردين والأنشوجة .

**موسم التكاثر :** أشهر الماء (مايو) - الفاتح (سبتمبر) .

**الحجم :** 50 - 200 سم .

**طرق الصيد :** التَّنْثَارَة ، الخيط الطويل (برنقالي) ، وشباك الإحاطة (التحليق) .



FAMILY : THUNNIDAE

عائلة : ثونيدي



الإسم المحلي : تونة طويلة الزعنفة (ألبكور)

الإسم العلمي : ثناس ألالونقا

*Thunnus alalunga*

الإسم الإنجليزي : ألبكور

*Albacore*

## تونة طويلة الزعنفة (ألبكور)

**المعيشة :** عائمة بالمياه العليا ، مهاجرة تعيش في مجموعات بالمياه الدافئة والباردة .

**الغذاء :** القشريات ، الرخويات ، وأسماك السردين والأنشوجة .


**موسم التكاثر :** فصل الصيف ؛ أشهر الصيف (يونيو) – هانيبال (أغسطس) .

**الحجم :** 50 – 100 سم .

**طرق الصيد :** التُّنَّارة ، الخيط الطويل (برنقالي) وشباك الإحاطة (التحليق) .

FAMILY : THUNNIDAE

عائلة : ثونيدي



الإسم المحلي : التونة الوثأبة (سكيب جاك)

الإسم العلمي : كاتسيوونوس بيلاميس

*Katsuwonus pelamis*

الإسم الإنجليزي : سكيب جاك تونا

*Skipjack tuna*

## التونة الوثأبة (سكيب جاك)

المعيشة : عائمة ومهاجرة تعيش في مجموعات بالمياه الدافئة .

الغذاء : أسماك السردين والأنشوقة .

موسم التكاثر : أشهر الطّير (إبريل) - الفاتح (سبتمبر) .

الحجم : 30 - 100 سم .

طرق الصيد : الخيط الطويل (برنقالي) وشباك الإحاطة (التحليق) .

FAMILY : THUNNIDAE

عائلة : ثونيدي



الإسم المحلي : التونة الصغيرة (رزام منقط)

الإسم العلمي : إيُونْتَّاسُ أَلْتَرَاتْسُ

*Euthynnus alletteratus*

الإسم الإنجليزي : ليتل تاني

*Little tunny*

## التونة الصغيرة (رزام منقّط)

**المعيشة :** عائمة بالمياه العليا ، تعيش في مجموعات بالمياه الدافئة القريبة من السواحل .

**الغذاء :** أسماك السردين والأنشوجة .


**موسم التكاثر :** أشهر الطير (إبريل) - الحرث (نوفمبر) .

**الحجم :** 30 - 100 سم .

**طرق الصيد :** الخيط الطويل (برنقالي) ، الشباك الخيشومية ، وشباك الإحاطة (التحليق) .

FAMILY : THUNNIDAE

عائلة : ثونيدي



الإسم المحلي : التونة الفرقاطة (رزام عادي)

الإسم العلمي : أيوكيسيز روكي

*Auxis rochei*

الإسم الإنجليزي : بوليت تونا

*Bullet tuna*

## **التونة الفرقاطة (رزام عادي)**

**المعيشة :** عائمة بالمياه العليا ، تعيش في مجموعات بالمياه الدافئة القريبة من السواحل والجزر .

**الغذاء :** أسماك السردين والأنشوجة .

**موسم التكاثر :** أشهر هانيبال (أغسطس) - الحرث (نوفمبر) .


**الحجم :** 20 - 50 سم .

**طرق الصيد :** الخيط الطويل (برنقالي) ، الشباك الخيشومية ، وشباك الإحاطة (التحليق) .



FAMILY : SCOMBERMORIDAE

عائلة : سكومبرموريدي



الإسم المحلي : البلاميطة (بونيتو)

الإسم العلمي : أورسينوبسيس يونيكولور

*Orcynopsis unicolor*

الإسم الإنجليزي : بلين بونيتو

*Plain bonito*

## **البلادامط (بونطو)**

**المعشة :** عائمة بالمياه العلىا ، ومهاجرة تعفش فف ماموعات بالمياه الدافئة القربفة من السواحل .

**الغذاء :** أسماك السردين والأنشوقة .

**موسم التكاثر :** أشهر ناصر (فولفو) - الفاتح (سبتمبر) .

**الحجم :** 25 - 110 سم .

**طرق الصفد :** التُّنَّارة ، الخفط الطوفل (برنقالف) وشباك الإحاطة (التلفق) .

FAMILY : SCOMBERMORIDAE

عائلة : سكومبرموريدي



الإسم المحلي : البلاميطة المخطط (بونيتو)

الإسم العلمي : ساردا ساردا

*Sarda sarda*

الإسم الإنجليزي : أطلانطيك بونيتو

*Atlantic bonito*

## البلادامط المخطط (بونيتو)

المعيشة : عائمة بالمياه العليا ، تعيش في مجموعات بالمياه الدافئة القريبة من السواحل .

الغذاء : أسماك السردين ، الحصان (الكواللي) والأنشوقة .


موسم التكاثر : أشهر الماء (مايو) - ناصر (يوليو) .

الحجم : 25 - 90 سم .

طرق الصيد : التُّنَّارة ، الخيط الطويل (برنقالي) ، وشباك الإحاطة (التحليق) .

FAMILY : XIPHIIDAE

عائلة : زيفيدى



الإسم المحلي : أبوسيف

الإسم العلمي : زيفياس قلادياس

*Xiphias gladius*

الإسم الإنجليزي : سوردفيش


*Swordfish*

## أبو سيف

- المعيشة : أسماك قاعية مهاجرة ، تعيش عند أعماق تصل إلى 100 متر .
- الغذاء : الأسماك (سردين ، كواللي) والرخويات (سبييا ، أخطبوط) .
- موسم التكاثر : أشهر الصيف (يونيو) - هانيبال (أغسطس) .
- الحجم : 25 - 35 سم .
- طرق الصيد : شباك الجرف ، والخيط الطويل (برنقالي) .

FAMILY : SCOMBRIDAE

عائلة : سكومبريدي



الإسم المحلي : الحصان (كواللي)

الإسم العلمي : سكومبرجابونيكوس

*Scomber japonicus*

الإسم الإنجليزي : تشوب ماكريل

*Chub mackerel*

## الحصان (كواللي)

**المعيشة :** أسماك عائمة بالمياه العليا ، وتعيش في مجموعات عند أعماق تتراوح بين 250 و 300 متر.

**الغذاء :** القشريات وأسماك السردين والأنشوجة .

**موسم التكاثر :** فصلا الربيع والصيف .

**الحجم :** 15 - 50 سم .

**طرق الصيد :** اللمبارة (شباك التحليق) .



FAMILY : SCOMBRIDAE

عائلة : سكومبريدي



الإسم المحلي : الحصان (كواللي)

الإسم العلمي : سكومبر سكومبرس

*Scomber scombrus*

الإسم الإنجليزي : أطلنطيك ماكربل

*Atlantic mackerel*

## الحصان (كواللي)

**المعيشة :** عائمة بالمياه العليا وتعيش في مجموعات عند أعماق تتراوح بين 200 و250 متراً .

**الغذاء :** القشريات وأسماك السردين وطحبان البحر .

**موسم التكاثر :** فصلا الربيع وأوائل فصل الصيف .

**الحجم :** 30 - 50 سم .

**طرق الصيد :** اللبارة (شباك التحليق) .

FAMILY : CORYPHAENIDAE

عائلة : كوريفينيدي



الإسم المحلي : سمكة الدلفين (لمبوكة)

الإسم العلمي : كوريفينا هيبوراس

*Coryphaena hippurus*

الإسم الإنجليزي : كومون دلفين فيش

*Common dolphin-fish*

## سمكة الدلفين (لمبوكة)

**المعيشة :** عائمة بالمياه المفتوحة ، وتعيش في مجموعات بالقرب من السواحل .

**الغذاء :** القشريات ، الرخويات وأسماك السردين والأنشوجة .


**موسم التكاثر :** فصلا الصيف والخريف .

**الحجم :** 100 – 200 سم .

**طرق الصيد :** شباك الإحاطة (التحليق) ، الخيط الطويل (برنقالي) ، والشباك الخيشومية .

FAMILY : CLUPEIDAE

عائلة : كلوبيدي



الإسم المحلي : السّردينة

الإسم العلمي : سبراتس سبراتس

*Sprattus sprattus*

الإسم الإنجليزي : سبرات

*Sprat*

## السردينة

**المعيشة :** عائمة ومهاجرة ، تعيش في مجموعات عند أعماق تصل إلى 100 متر .

**الغذاء :** القشريات ، الهوائم (العوالق) النباتية ويرقات الأسماك .

**موسم التكاثر :** أشهر الحرث (نوفمبر) - الطير (إبريل) .

**الحجم :** 8 - 16 سم .

**طرق الصيد :** اللبارة (شباك التحليق) .

FAMILY : CLUPEIDAE

عائلة : كلوبيدي



الإسم المحلي : السردينة

الإسم العلمي : سردينيلاً بلكاردس

*Sardinella pilchardus*

الإسم الإنجليزي : يورديان بلكارد

*European pilchard*

## السردينة

المعيشة : عائمة ومهاجرة ، تعيش في مجموعات عند أعماق تتراوح بين 15 و 55 متراً .

الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .

موسم التكاثر : أشهر الحرث (نوفمبر) - الصيف (يونيو) .

الحجم : 15 - 25 سم .

طرق الصيد : اللبارة (شباك التحليق) .



FAMILY : CLUPEIDAE

عائلة : كلوبيدي



الإسم المحلي : السردينة

الإسم العلمي : سردينلا أوريتا

*Sardinella aurita*

الإسم الإنجليزي : راوند سردينلا

*Round sardinella*

## السردينة

المعيشة : عائمة ومهاجرة ، تعيش في مجموعات عند أعماق تصل إلى 350 متراً .

الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .

موسم التكاثر : فصلا الربيع والصيف .

الحجم : 20 - 30 سم .

طرق الصيد : اللبارة (شباك التحليق) .

FAMILY : CLUPEIDAE

عائلة : كلوبيدي



الإسم المحلي : اللّوزة

الإسم العلمي : سردينلا مادرينسس

*Sardinella maderensis*

الإسم الإنجليزي : مادييران سردينلا

*Madeiran sardinella*

## اللُّوزة

**المعيشة :** عائمة ومهاجرة ، تعيش في مجموعات عند أعماق تصل إلى 50 متراً .

**الغذاء :** اللافقاريات ، يرقات الأسماك و الهوائم النباتية .

**موسم التكاثر :** فصل الصيف . أشهر الصيف (يونيو) – هانيبال (أغسطس) .

**الحجم :** 20 – 30 سم .

**طرق الصيد :** اللبارة (شباك التحليق) .

FAMILY : ENGRAULIDAE

عائلة : إنقروليدي



الإسم المحلي : الأنشوقة

الإسم العلمي : أنقروليس إنكراسيكولس

*Engraulis encrasicolus*

الإسم الإنجليزي : يوروبيان أنكوفي

*European anchovy*

## الأنشوقة

**المعيشة :** عائمة ومهاجرة في مجموعات عند أعماق تصل إلى 150 متراً .

**الغذاء :** الهوائم (العوالق) الحيوانية ويرقات الأسماك .

**موسم التكاثر :** أشهر الطير (أبريل) - هانيبال (أغسطس) .

**الحجم :** 12 - 20 سم .

**طرق الصيد :** اللبارة (شباك التحليق) .

FAMILY : BELONIDAE

عائلة : بيلونيدي



الإسم المحلي : إبرة البحر

الإسم العلمي : بيلون بيلون

*Belone belone*

الإسم الإنجليزي : قارفيش

*Garfish*

## إبرة البحر

**المعيشة :** قاعية تعيش بالأعماق العليا الدافئة القريبة من الشواطئ .

**الغذاء :** يرقات الأسماك والقشريات .

**موسم التكاثر :** أشهر النّوّار (فبراير) - الماء (مايو) .


**الحجم :** 40 - 100 سم .

**طرق الصيد :** الشباك الخيشومية وشباك الإحاطة (التحليق) .



FAMILY : CARANGIDAE

عائلة : كارانجيدي



الإسم المحلي : الصاؤنؤ

الإسم العلمي : تراكيورس ميدترنياس

*Trachurus mediterraneus*

الإسم الإنجليزي : ميدترانيان هورس ماكريل

*Mediterranean horse-mackerel*

## الصَّاورُو

المعيشة : عائمة قرب القاع ، ومهاجرة تعيش في مجموعات عند أعماق تتراوح بين 40 و 500 متر .

الغذاء : القشريات وأسماك السردين والأنشوجة .


موسم التكاثر : فصل الصيف . أشهر الصيف (يونيو) - هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 10 - 50 سم .

طرق الصيد : اللبارة (شباك التحليق) وشباك الجرف .

FAMILY : CARANGIDAE

عائلة : كارانجيدي



الإسم المحلي : الصائو

الإسم العلمي : تراكيورس تراكيورس

*Trachurus trachurus*

الإسم الإنجليزي : أطلنطيك هورس ماكريل

*Atlantic horse-mackerel*

## الصَّاورُو

المعيشة : عائمة تعيش بالمناطق الرملية عند أعماق تتراوح بين 100 و 200 متر .

الغذاء : القشريات ، الرخويات ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : فصل الصيف . أشهر الصيف (يونيو) - هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 30 - 60 سم .

طرق الصيد : اللبارة (شباك التحليق) ، شباك الجرف والخيط الطويل (برنقالي) .

FAMILY : CARANGIDAE

عائلة : كارانجيدي



الإسم المحلي : الشؤلة

الإسم العلمي : سيريو لا دوميريلي

*Seriola dumerili*

الإسم الإنجليزي : قريرتر أمبرجك

*Greater amberjack*

## السُّؤْلَة

المعيشة : عائمة ، تعيش بالقرب من الشواطئ والشعاب المرجانية عند أعماق تتراوح بين 18 و 72 متراً .

الغذاء : الأسماك (سردين ، أنشوجة ، كواللي) واللافقاريات .


موسم التكاثر : فصل الصيف . أشهر الصيف (يونيو) – هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 30 – 188 سم .

طرق الصيد : شباك الإحاطة (التحليق) ، الشباك الخيشومية ، والخيوط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : CARANGIDAE

عائلة : كارانجيدي



الإسم المحلي : الصلفاقة (استراليا)

الإسم العلمي : ليشيا أميا

*Lichia amia*

الإسم الإنجليزي : ليرفیش

*Leerfish*

## الصُّلْفَاة (استريليا)

المعيشة : عائمة ، تعيش عند أعماق تصل إلى 50 متراً .

الغذاء : أسماك السردين ، الأنشوجة والكواللي .

موسم التكاثر : فصل الصيف . أشهر الصيف (يونيو) - هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 30 - 180 سم .

طرق الصيد : شباك الإحاطة (التحليق) ، الشباك الخيشومية ، والخيط الطويل (البرنقالي) .



FAMILY : MERLUCCIDAE

عائلة : ميرلوسيدي



الإسم المحلي : النازلّي (مارلوتسو)

الإسم العلمي : مرلوشياس مرلوشياس

*Merluccius merluccius*

الإسم الإنجليزي : هيك

*Hake*

## النّازلّي (مارلوتسو)

**المعيشة :** قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 100 و 300 متر .

**الغذاء :** القشريات وأسماك السردين والأنشوقة .


**موسم التكاثر :** فصلا الشتاء والربيع .

**الحجم :** 15 - 90 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف ، والخيوط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : GADIDAE

عائلة : قاديدي



الإسم المحلي : النازلّي (مارلوتسو)

الإسم العلمي : ترايسوبيتروس مينوتاس

*Trisopterus minutus*

الإسم الإنجليزي : بوركود

*Poor cod*

## النازلِّي (مارلوتسو)

**المعيشة :** قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 30 و 300 متر .

**الغذاء :** القشريات ، الديدان البحرية ويرقات الأسماك .


**موسم التكاثر :** أشهر النّوّار (فبراير) - الطير (إبريل) .

**الحجم :** 15 - 26 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف .

FAMILY : GADIDAE

عائلة : قاديدي



الإسم المحلي : النازلّي (مارلوتسو)

الإسم العلمي : ميرلانجياس ميرلانجس

*Merlangius merlangus*

الإسم الإنجليزي : وايتنج

*Whiting*

## النازلّي (مارلوتسو)

**المعيشة :** أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 5 و 100 متر .

**الغذاء :** القشريات ، الديدان البحرية ويرقات الأسماك .

**موسم التكاثر :** أشهر أيّ النار (يناير) - ناصر (يوليو) .

**الحجم :** 15 - 70 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف .

FAMILY : GADIDAE

عائلة : قاديدي



الإسم المحلي : النازلّي (مارلوتسو)

الإسم العلمي : ميكروميسيسيستوس بوتاسو

*Micromesistius poutassou*

الإسم الإنجليزي : بلو وايتنج

*Blue whiting*

## النازلِّي (مارلوتسو)

**المعيشة :** أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 30 و 400 متر .

**الغذاء :** القشريات ويرقات الأسماك .

**موسم التكاثر :** فصلا الربيع والصيف .


**الحجم :** 25 - 40 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والخيوط الطويل (البرنقالي) .



FAMILY : GADIDAE

عائلة : قاديدي



الإسم المحلي : النازلّي (مارلوتسو)

الإسم العلمي : تريسوبيترس لوسكاس

*Trisopterus luscus*

الإسم الإنجليزي : بوتنج (بيب)

*Pouting (bib)*

## النازلِّي (مارلوتسو)

**المعيشة :** أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية عند أعماق تتراوح بين 30 و 100 متر .

**الغذاء :** القشريات ، الديدان البحرية ويرقات الأسماك .


**موسم التكاثر :** شهرا المريّخ (مارس) و الطير (إبريل) .

**الحجم :** 15 - 45 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : GADIDAE

عائلة : قاديدي



الإسم المحلي : النازلّي (مارلوتسو)

الإسم العلمي : قيدروبسرس ميدترّانياس

*Gaidropsarus mediterraneus*

الإسم الإنجليزي : شور روكنج

*Shore rockling*

## النازلِّي (مارلوتسو)

**المعيشة :** أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية عند أعماق تتراوح بين 27 و 100 متر .

**الغذاء :** يرقات الأسماك ، الديدان البحرية ، القشريات والطحالب البحرية .


**موسم التكاثر :** فصل الشتاء وأوائل الربيع .

**الحجم :** 5 - 30 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : GADIDAE

عائلة : قاديدي



الإسم المحلي : الذئب (لوبو)

الإسم العلمي : فايسيس بلنؤيدس

*Phycis blennoides*

الإسم الإنجليزي : جريتير فوركبيرد

*Greater fork-beard*

## الذئب ( لوبو )

**المعيشة :** أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 10 و 300 متر .

**الغذاء :** القشريات ويرقات الأسماك .


**موسم التكاثر :** فصل الربيع وأوائل الصيف .

**الحجم :** 30 - 75 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف ، والخيوط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : GADIDAE

عائلة : قاديدي



الإسم المحلي : الذئب (ذئب)

الإسم العلمي : فايسيس فايسيس

*Phycis phycis*

الإسم الإنجليزي : فورك بيرد

*Fork-beard*

## الذئب (ديب)

**المعيشة :** أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية عند أعماق تتراوح بين 100 و 200 متر .

**الغذاء :** القشريات ويرقات الأسماك .

**موسم التكاثر :** أشهر أيّ النار (يناير) - الماء (مايو) .

**الحجم :** 15 - 65 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والخيوط الطويل (البرنقالي) .



FAMILY : MUGILIDAE

عائلة : ميوجليدي



الإسم المحلي : البوري بودماغ

الإسم العلمي : ميوجل سيفالاس

*Mugil cephalus*

الإسم الإنجليزي : فلاتهيد قرى موليت

*Flathead grey mullet*

## البوري بودماغ

المعيشة : عائمة ، تعيش بالمياه الدافئة القريبة من الشواطئ والبحيرات .

الغذاء : اللافقاريات ، الطحالب وكائنات الهوائم الدقيقة .

موسم التكاثر : أشهر ناصر (يوليو) - الثَّمُور (أكتوبر) .

الحجم : 20 - 100 سم .

طرق الصيد : الشباك الخيشومية ، شباك المحيرّ (الترامل) ، والصنارة والخيط .

FAMILY : MUGILIDAE

عائلة : ميوجليدي



الإسم المحلي : البوري بوشارب

الإسم العلمي : كيلون لا بروساس

*Chelon labrosus*

الإسم الإنجليزي : ثيكليب قرى موليت

*Thicklip grey mullet*

## البوري بونميلة (أوراغي)

المعيشة : عائمة ، تعيش بالمياه الدافئة القريبة من الشواطئ والبحيرات .

الغذاء : اللافقاريات ، وكائنات الهوائم الدقيقة .


موسم التكاثر : فصل الصيف . أشهر الصيف (يونيو) - هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 5 - 50 سم .

طرق الصيد : الشباك الخيشومية ، شباك المحيّر (الترامل) ، والصنارة والخيوط .

FAMILY : MUGILIDAE

عائلة : ميوجليدي



الإسم المحلي : البوري

الإسم العلمي : ليزا ساليانس

*Liza saliens*

الإسم الإنجليزي : لينج موليت

*Leaping mullet*

## البوزي

المعيشة : عائمة ، تعيش بالمياه الدافئة القريبة من الشواطئ والبحيرات .

الغذاء : اللافقاريات وكائنات الهوائم الدقيقة .


موسم التكاثر : فصل الصيف ، أشهر الصيف (يونيو) - هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 15 - 40 سم .

طرق الصيد : الشباك الخيشومية ، شباك المحيرّ (الترامل) والصنارة والخيوط .

FAMILY : MUGILIDAE

عائلة : ميوجليدي



الإسم المحلي : البودي

الإسم العلمي : ليزا رامادا

*Liza ramada*

الإسم الإنجليزي : ثنليب قرى موليت

*Thinlip grey mullet*

## البوري

**المعيشة :** عائمة ، تعيش بالمياه الدافئة القريبة من الشواطئ والبحيرات والأنهار .

**الغذاء :** اللافقاريات ، الطحالب ، وكائنات الهوائم الدقيقة .

**موسم التكاثر :** أشهر التمور (أكتوبر) - الكانون (ديسمبر) .


**الحجم :** 20 - 60 سم .

**طرق الصيد :** الشباك الخيشومية ، شباك المحيرّ (الترامل) والصنارة والخيوط .



FAMILY : MUGILIDAE

عائلة : ميوجليدي



الإسم المحلي : البوري

الإسم العلمي : أوداليكيلس لابيو

*Oedalechilus laeo*

الإسم الإنجليزي : بوكسليب موليت

*Boxlip mullet*

## البوري

المعيشة : عائمة ، تعيش بالمياه الدافئة القريبة من الشواطئ والبحيرات .

الغذاء : اللافقاريات وكائنات الهوائم الدقيقة .

موسم التكاثر : فصلا الربيع والصيف .

الحجم : 5 - 25 سم .

طرق الصيد : الشباك الخيشومية ، والخيط بالصنّار.

FAMILY : MORONIDAE

عائلة : مورونيدي



الإسم المحلي : القاروص العادي

الإسم العلمي : ديستنتاركس لابرکس

*Dicentrarchus labrax*

الإسم الإنجليزي : يوربيآن سيباس

*European seabass*

## القاروص العادي

**المعيشة :** عائمة بالمياه الدافئة القريبة من الشواطئ والبحيرات والأنهار .

**الغذاء :** القشريات ، القواقع البحرية ويرقات الأسماك .

**موسم التكاثر :** شهرا أيّ النار (يناير) و النوّار (فبراير) .

**الحجم :** 20 – 100 سم .

**طرق الصيد :** شباك الإحاطة (التحليق) ، الشباك الخيشومية ، والخيط بالصنّار .

FAMILY : MORONIDAE

عائلة : مورونيدي



الإسم المحلي : القاروص المنقط

الإسم العلمي : ديسنتراركس بنكتاتس

*Dicentrarchus punctatus*

الإسم الإنجليزي : سبوتد سيباس

*Spotted seabass*

## القاروص المنقّط

المعيشة : عائمة بالمياه الدافئة القريبة من الشواطئ والبحيرات والأنهار .

الغذاء : القشريات ، القواقع البحرية ، ويرقات الأسماك .

موسم التكاثر : شهرا أيّ النار (يناير) و النّوّار (فبراير) .

الحجم : 20 - 70 سم .

طرق الصيد : شباك الإحاطة (التحليق) ، الشباك الخيشومية ، والخيط بالصنّار .

FAMILY : MULLIDAE

عائلة : ميوليدي



الإسم المحلي : السلطان إبراهيم (تريليا حجر)

الإسم العلمي : مولّس سرميوليتس

*Mullus surmuletus*

الإسم الإنجليزي : ستريبد ريد موليت

*Striped red mullet*

## السلطان إبراهيم (تريليا حجر)

المعيشة : قاعية تعيش بالمناطق الصخرية و الرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 100 متر .

الغذاء : الأحياء القاعية الدقيقة (القشريات والقواقع البحرية) .

موسم التكاثر : أشهر الماء (مايو) - ناصر (يوليو) .


الحجم : 20 - 40 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .



FAMILY : MULLIDAE

عائلة : ميوليدي



الإسم المحلي : السلطان إبراهيم (تريليا رمل)

الإسم العلمي : مولاس بارباتس

*Mullus barbatus*

الإسم الإنجليزي : ريد موليت

*Red mullet*

## السلطان إبراهيم (تريليا رمل)

**المعيشة :** قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة والصخرية عند أعماق تتراوح بين 100 و 300 متر .

**الغذاء :** الأحياء القاعية الدقيقة (القشريات ، الديدان والقواقع البحرية) .

**موسم التكاثر :** أشهر الطير (إبريل) - هانيبال (أغسطس) .

**الحجم :** 10 - 30 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلي : المرجان العادي (باقرو)

الإسم العلمي : باقرس باقرس

*Pagrus pagrus*

الإسم الإنجليزي : كومون سيبريم

*Common sea bream*

## **المرجان العادي (باقرو)**

**المعيشة :** قاعيّة ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية عند أعماق تصل إلى 250 متراً .

**الغذاء :** القشريات والقواقع البحرية .


**موسم التكاثر :** فصلا الشتاء والربيع .

**الحجم :** 20 – 70 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلي : مرجان النقط الزرقاء (باقرو)

الإسم العلمي : باقرس كورليوستيكتس

*Pagrus coeruleostictus*

الإسم الإنجليزي : بلوسبوت سبيريم

*Blue-spotted sea bream*

## المرجان البرنزي (بازوكا)

**المعيشة :** قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 250 متراً .

**الغذاء :** القشريات ، القواقع البحرية و يرقات الأسماك .


**موسم التكاثر :** شهر الصيف (يونيو) ، شهر الفاتح (سبتمبر) ، وفصل الخريف .

**الحجم :** 20 - 35 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلي : المرجان بوعين

الإسم العلمي : دينتكس ماكرفثالمس

*Dentex macrophthalmus*

الإسم الإنجليزي : لارج آيد دينتكس

*Large-eyed dentex*

## المرجان بوعين

**المعيشة :** قاعيّة ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 20 و 250 متراً .

**الغذاء :** القشريات ويرقات الأسماك .

**موسم التكاثر :** فصل الشتاء ، شهرا الطير (أبريل) و الماء (مايو) .


**الحجم :** 15 - 30 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والخيوط الطويل (البرنقالي) .



FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلي : المرجان الأحمر

الإسم العلمي : باجيلأس إريثرينس

*Pagellus erythrinus*

الإسم الإنجليزي : كومون باندورا

*Common pandora*

## المرجان الأحمر

**المعيشة :** قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 20 و 200 متر .

**الغذاء :** القشريات ، القواقع والديدان البحرية ، ويرقات الأسماك .


**موسم التكاثر :** فصلا الربيع والصيف .

**الحجم :** 15 - 55 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف ، والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلي : العضاَض (جفّالي)

الإسم العلمي : دنتكس جيبوسس

*Dentex gibosus*

الإسم الإنجليزي : بينك دنتكس

*Pink dentex*

## العضاض (جفالي)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية عند أعماق تتراوح بين 20 و 220 متراً .

الغذاء : الأسماك ، القشريات ، والرخويات (السُّببيا والأخطبوط) .

موسم التكاثر : فصل الربيع ؛ أشهر المزيخ (مارس) - الماء (مايو) .

الحجم : 40 - 100 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، الشباك الخيشومية والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلي : العَضَّاض (دندشي)

الإسم العلمي : دنتكس دنتكس

*Dentex dentex*

الإسم الإنجليزي : كومون دنتكس

*Common dentex*

## **العضاض (دندشي)**

**المعيشة :** قاعية ، تعيش عند أعماق تتراوح بين 15 و 200 متر .

**الغذاء :** يرقات الأسماك والرخويات (السّييا والأخطبوط).


**موسم التكاثر :** شهر الماء (مايو) .

**الحجم :** 35 – 100 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف ، والشباك الخيشومية ، والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلي : الدنيس (أوراتا)

الإسم العلمي : سبارس أوراتا

*Sparus aurata*

الإسم الإنجليزي : جيلتهيد سبيريم

*Gilt-head sea bream*

## **الدُّنيس (أوراتا)**

**المعيشة :** قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية ، وفي البحيرات ، عند أعماق تتراوح بين 30 و 150 متراً .

**الغذاء :** القشريات ، القواقع والديدان البحرية .

**موسم التكاثر :** أشهر التمور (أكتوبر) - الكانون (ديسمبر) .


**الحجم :** 20 - 70 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف ، الشباك الخيشومية والخيط الطويل (البرنقالي) .



FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلي : القراقُوز الموشَّم

الإسم العلمي : دبلودس فولقارس

*Diplodus vulgaris*

الإسم الإنجليزي : كومون توباند سبيريم

*Common two-banded sea bream*

## القَرَأُقُوزُ المَوْشَمُ

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية عند أعماق تتراوح بين 15 و 70 متراً .

الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : أشهر التمور (أكتوبر) - أيّ النار (يناير) .

الحجم : 15 - 40 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، الشباك الخيشومية ، والخيوط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلي : المنكوس

الإسم العلمي : ليثوقناثس مورميرس

*Lithognathus mormyrus*

الإسم الإنجليزي : ستريد سيبريم

*Striped sea bream*

## الْمَنْكُوسُ

**المعيشة :** أسماك قاعية تعيش بالمناطق الصخرية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 15 و 50 متراً .

**الغذاء :** القشريات ويرقات الأسماك .


**موسم التكاثر :** فصلا الربيع والصيف .

**الحجم :** 20 - 30 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلي : الكَحْلَةُ

الإسم العلمي : أوبلادا ميلانورا

*Oblada melanura*

الإسم الإنجليزي : سادلد بريم

*Saddledbream*

## الكحلة

المعيشة : أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية عند أعماق تصل إلى 30 متراً .

الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .

موسم التكاثر : أشهر الطير (أبريل) - الصيف (يونيو) .

الحجم : 35 - 100 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، الشباك الخيشومية ، والخيوط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلي : الحَمْرَايَةُ

الإسم العلمي : باجيلّاس بوجارافيو

*Pagellus bogaraveo*

الإسم الإنجليزي : ريد سيبريم

*Red sea bream*

## الحَمْرَايَةُ

**المعيشة :** قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 400 متر .

**الغذاء :** القشريات ويرقات الأسماك .

**موسم التكاثر :** أشهر أيّ النار (يناير) - الماء (مايو) .


**الحجم :** 30 - 50 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والشباك الخيشومية .



FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلي : التُّنُوتُ

الإسم العلمي : سبونديليوسوما كانثارس

*Spondyliosoma cantharus*

الإسم الإنجليزي : بلاك سيبريم

*Black sea bream*

## التُّنُوت

**المعيشة :** أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية عند أعماق تصل إلى 50 متراً .

**الغذاء :** القشريات ، الطحالب الخضراء والأعشاب البحرية .

**موسم التكاثر :** أشهر النوار (فبراير) - الماء (مايو) .

**الحجم :** 20 - 50 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلي : الشَّلْبَةُ

الإسم العلمي : ساربا سالبا

*Sarpa salpa*

الإسم الإنجليزي : سالما

*Salema*

## السَّلْبَةُ

**المعيشة :** قاعية و شاطئيّة ، تعيش في مجموعات بالمناطق الصخرية (المغطاة بالطحالب) و المناطق الرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 5 و 70 متراً .  
**الغذاء :** الأعشاب البحرية ، والطحالب الخضراء .


**موسم التكاثر :** فصلا الربيع والخريف .

**الحجم :** 25 - 45 سم .

**طرق الصيد :** الشباك الخيشومية وشباك الجرف .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلي : الموزة (البوقة)

الإسم العلمي : بوبس بوبس

*Boops boops*

الإسم الإنجليزي : بوق

*Bogue*

## الموزة (البوقة)

**المعيشة :** قاعية ، أو شبه عائمة ، تعيش في مجموعات بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 200 متر .

**الغذاء :** القشريات ، الأعشاب البحرية ، الأسفنج والطحالب الخضراء ،


**موسم التكاثر :** شهرا الطير (أبريل) و الماء (مايو) .

**الحجم :** 20 - 36 سم .

**طرق الصيد :** اللمبارة (شباك التحليق) وشباك الجرف .

FAMILY : SCORPAENIDAE

عائلة : سكوربينيدي



الإسم المحلي : العقرب الأحمر (شكورفو)

الإسم العلمي : سكوربيننا شكورفا

*Scorpaena scorfa*

الإسم الإنجليزي : ريد سكوربيون فيش

*Red scorpionfish*

## **العقرب الأحمر (شكورفو)**

**المعيشة :** أسماك قاعية تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 20 و 200 متر .

**الغذاء :** الأسماك ، القشريات والقواقع البحرية .

**موسم التكاثر :** فصلا الربيع والصيف .


**الحجم :** 20 - 50 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والشباك الخيشومية .



FAMILY : SCORPAENIDAE

عائلة : سكوربينيدي



الإسم المحلي : العَقْرَبُ الأسود (شكورفو)

الإسم العلمي : سكوربيننا بوركس

*Scorpaena porcus*

الإسم الإنجليزي : بلاك سكوربيون فيش

*Black scorpionfish*

## **العَقْرَبُ الأسود (شكورفو)**

**المعيشة :** أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية المغطاة بالطحالب عند أعماق تصل إلى 800 متر .

**الغذاء :** الأسماك والقشريات .


**موسم التكاثر :** فصلا الربيع والصيف .

**الحجم :** 15 - 25 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : SCORPAENIDAE

عائلة : سكوربينيدي



الإسم المحلي : العقرب الأحمر (شكورفو)

الإسم العلمي : سكوربيننا شكورفا

*Scorpaena scorfa*

الإسم الإنجليزي : ريد سكوربيون فيش

*Red scorpionfish*

## **العقرب الأحمر (شكورفو)**

**المعيشة :** أسماك قاعية تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 20 و 200 متر .

**الغذاء :** الأسماك ، القشريات والقواقع البحرية .

**موسم التكاثر :** فصلا الربيع والصيف .

**الحجم :** 20 - 50 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : TRIGLIDAE

عائلة : تريقليدي



الإسم المحلي : الدجاجة

الإسم العلمي : إيوتريجلا جورناردس

*Eutrigla gurnardus*

الإسم الإنجليزي : قري قورنارد

*Grey gurnard*

## الدَّجَاجَةُ

المعيشة : قاعية تعيش بالمناطق الصخرية عند أعماق تصل إلى 170 متراً .

الغذاء : القشريات ، القواقع ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : فصل الصيف ؛ أشهر الصيف (يونيو) - هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 20 - 40 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : TRIGLIDAE

عائلة : تريقليدي



الإسم المحلي : الدجاجة

الإسم العلمي : تريقلا لوسيرنا

*Trigla lucerna*

الإسم الإنجليزي : تب قورنارد

*Tub gurnard*

## الدَّجَاجَةُ

**المعيشة :** قاعية تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 20 و 300 متر .

**الغذاء :** القشريات ، القواقع ويرقات الأسماك .

**موسم التكاثر :** أشهر الماء (مايو) - ناصر (يوليو) .


**الحجم :** 20 - 75 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف .



FAMILY : TRIGLIDAE

عائلة : تريقليدي



الإسم المحلي : الدجاجة

الإسم العلمي : أسبتريغلا كيوكولس

*Aspitrigla cuculus*

الإسم الإنجليزي : ريد قورنارد

*Red gurnard*

## الدُّجَاجَة

**المعيشة :** قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 30 و 250 متراً .

**الغذاء :** القشريات ، القواقع ويرقات الأسماك .

**موسم التكاثر :** أشهر الطير (إبريل) - هانيبال (أغسطس) .

**الحجم :** 25 - 50 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف .

FAMILY : TRIGLIDAE

عائلة : تريقليدي



الإسم المحلي : الدَّجَاجَةُ

الإسم العلمي : تريكلوبورس لستوفيزا

*Trigloporus lastoviza*

الإسم الإنجليزي : استريكد قورنارد

*Streaked gurnard*

## الدَّجَاجَةُ

**المعيشة :** قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 150 متراً .

**الغذاء :** القشريات ويرقات الأسماك .


**موسم التكاثر :** فصل الصيف ؛ أشهر الصيف (يونيو) - هانيبال (أغسطس) .

**الحجم :** 20 - 40 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف .

FAMILY : SCIAENIDAE

عائلة : سيانيدي



الإسم المحلي : البَقْلَةُ

الإسم العلمي : أمبرينا سيرّوذا

*Umbrina cirrosa*

الإسم الإنجليزي : شي درم

*Shi drum*

## البَغْلَةُ

**المعيشة :** قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية عند أعماق تصل إلى 100 متر .

**الغذاء :** أحياء القاع (قشريات وقواقع بحرية) .


**موسم التكاثر :** فصلا الربيع والصيف .

**الحجم :** 40 - 70 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : SCIAENIDAE

عائلة : سيانيدي



الإسم المحلي : الغُرَابُ

الإسم العلمي : سينا أومبرا

*Sciaena umbra*

الإسم الإنجليزي : براون ميقر

*Brown meagre*

## الغُرَابُ

**المعيشة :** أسماك تعيش بالمناطق الصخرية بالقرب من الشواطئ وعند أعماق تتراوح بين 20 و 130 متراً .

**الغذاء :** يرقات الأسماك والقشريات .

**موسم التكاثر :** أشهر المريخ (مارس) - هانيبال (أغسطس) .


**الحجم :** 10 - 50 سم .

**طرق الصيد :** الشباك الخيشومية و شباك الجرف .



FAMILY : LOPHIIDAE

عائلة : لوفيدي



الإسم المحلي : أبوشص (جرانة)

الإسم العلمي : لوفوس بسكتورياس

*Lophius piscatorius*

الإسم الإنجليزي : أنكلرفيش

*Anglerfish*

## **أَبُو شَمْنُ (جَرَانَةُ)**

**المعيشة :** أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والوحلة عند أعماق تصل إلى 500 متر .

**الغذاء :** الأسماك ، القشريات ، وأحياناً الطيور البحرية .


**موسم التكاثر :** أشهر النوار (فبراير) - ناصر (يوليو) .

**الحجم :** 20 - 200 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : URANOSCOPIDAE

عائلة : يورانوسكوبيدي



الإسم المحلي : البومة (بُلْم)

الإسم العلمي : يورانوسكوبس سكابر

*Uranoscopus scaber*

الإسم الإنجليزي : ستار قيزر

*Stargazer*

## البُومَةُ (بُلْم)

**المعيشة :** قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 15 و 100 متر .

**الغذاء :** الأسماك الصغيرة والقشريات .


**موسم التكاثر :** أشهر الطير (أبريل) - هانيبال (أغسطس) .

**الحجم :** 20 - 35 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : ZEIDAE

عائلة : زيدي



الإسم المحلي : المَرَايا (سان بيترو)

الإسم العلمي : زياس فابر

*Zeus faber*

الإسم الإنجليزي : أطلنطيك جون دوري

*Atlantic John Dory*

## المَرَايا (سان بييترو)

المعيشة : قاعية تعيش بالمناطق الصخرية والرملية ، عند أعماق تتراوح بين 50 و 400 متر .

الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : أشهر الصيف (يونيو) - هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 20 - 66 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : POMATOMIDAE

عائلة : بوماتوميدي



الإسم المحلي : الميَّاسُ (سيرا)

الإسم العلمي : بوماتوماس سالتيتور

*Pomatomus saltator*

الإسم الإنجليزي : بلوفيش

*Bluefish*

## المَيَّاسُ (سَيِّراً)

المعيشة : عائمة ومهاجرة ، تعيش في مجموعات بالمياه الدافئة عند أعماق تتراوح بين 5 و 200 متر .

الغذاء : القشريات والرخويات (السيبيا والأخطبوط) .

موسم التكاثر : فصلا الربيع والصيف .


الحجم : 40 - 110 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والخيوط الطويل (البرنقالي) .



FAMILY : TRACHINIDAE

عائلة : تراكيندي



الإسم المحلي : التُّراخين المنقُط (تراجنًا)

الإسم العلمي : تراكينس أرائيوس

*Trachinus araneus*

الإسم الإنجليزي : سبوتيد ويفر

*Spotted weaver*

## التراخين المنقط (تراجنا)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة ، عند أعماق تصل إلى 150 متراً .

الغذاء : الأسماك الصغيرة والقشريات .


موسم التكاثر : فصلا الربيع والصيف .

الحجم : 25 - 30 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : SERRANIDAE

عائلة : سُرانيدي



الإسم المحلي : الفُرُوج (دُوت)

الإسم العلمي : إيبينفلاس قوزا

*Epinephelus guaza*

الإسم الإنجليزي : دسكي قروب

*Dusky grouper*

## الفَرْوَجُ (دُوت)

**المعيشة :** أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية عند أعماق تتراوح بين 8 و 200 متر .

**الغذاء :** الرخويات (السيبيا والأخطبوط) والقشريات والأسماك .


**موسم التكاثر :** فصل الصيف ؛ أشهر الصيف (يونيو) - هانيبال (أغسطس) .

**الحجم :** 20 - 160 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف ، الخيط بالصنار والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SERRANIDAE

عائلة : سُرانيدي



الإسم المحلي : المَتَّاني (فَرُوجُ أَخْطَل)

الإسم العلمي : بوليبريون أمريكي

*Polyprion americanus*

الإسم الإنجليزي : ريك فيش

*Wreckfish*

## المنّاني (فُرُوجُ أَحْمَل)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 40 و 1000 متر .

الغذاء : القشريات ، القواقع ، ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : فصل الصيف ؛ أشهر الصيف (يونيو) - هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 30 - 100 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، الشباك الخيشومية والخيوط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SERRANIDAE

عائلة : سُرانيدي



الإسم المحلي : الثَّانِي

الإسم العلمي : إيبينفلاس إنياس

*Epinephelus aeneus*

الإسم الإنجليزي : وايت قروب

*White grouper*

## الْمَنَانِي

**المعيشة :** أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 20 و 200 متر .

**الغذاء :** الرخويات (السيبيا والأخطبوط) ، القشريات والأسماك .

**موسم التكاثر :** فصل الربيع ؛ أشهر المريخ (مارس) - الماء (مايو) .


**الحجم :** 20 - 120 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف ، الخيط بالصنار والخيط الطويل (البرنقالي) .



FAMILY : SERRANIDAE

عائلة : سُرانيدي



الإسم المحلي : السُرَّانُ

الإسم العلمي : سِرَّانس كبريلاً

*Serranus cabrilla*

الإسم الإنجليزي : كومبر

*Comber*

## السَّرَّان

**المعيشة :** قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 500 متر .

**الغذاء :** القشريات ويرقات الأسماك .

**موسم التكاثر :** أشهر الطير (إبريل) - ناصر (يوليو) .

**الحجم :** 20 - 45 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : SERRANIDAE

عائلة : سُرَانِيدِي



الإسم المحلي : البراكش (القَبْرُون)

الإسم العلمي : سِرَانُس سَكْرِيْبَا

*Serranus scriba*

الإسم الإنجليزي : بينتد كومبر

*Painted comber*

## البَراكِشُ (القَبْرُون)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية عند أعماق تصل إلى 150 متراً .

الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : أشهر الطير (أبريل) - هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 20 - 40 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : LABRIDAE

عائلة : لَابْرِيدِي



الإسم المحلي : الخَضِيرُ (أبو خَضِير)

الإسم العلمي : لَابْرَاس بَرْجِيلَاتَا

*Labrus bergylata*

الإسم الإنجليزي : بِلَانْ رَاسْ

*Ballan wrasse*

## **الخصير (أبو خصير)**

**المعيشة :** قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية المغطاة بالأعشاب والطحالب البحرية القريبة من الشواطئ عند أعماق تتراوح بين 1 و 20 متراً .

**الغذاء :** القشريات والقواقع البحرية .


**موسم التكاثر :** أشهر المريخ (مارس) - الماء (مايو) و فصل الصيف .

**الحجم :** 30 - 50 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف ، والشباك الخيشومية .

FAMILY: LABRIDAE

عائلة : لَابْرِيدِي



الإسم المحلي : العريّسة

الإسم العلمي : كوريس جوليس

*Coris julis*

الإسم الإنجليزي : رينبوراس

*Rainbow wrasse*

## العريسة

**المعيشة :** قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية المغطاة بالأعشاب البحرية القريبة من الشواطئ عند أعماق تتراوح بين 1 و 60 متراً .

**الغذاء :** القشريات ، القواقع والديدان البحرية .

**موسم التكاثر :** أشهر الطير (أبريل) – هانيبال (أغسطس) .


**الحجم :** 15 – 25 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والشباك الخيشومية .



FAMILY : CENTRACANTHIDAE

عائلة : سينتراكانثيدي



الإسم المحلي : أبوزمارة (زميمرة)

الإسم العلمي : سبيكارا سمارس

*Spicara smaris*

الإسم الإنجليزي : بيكاريل

*Picarel*

## أبو زَمَارَة (زَمِيمَرَة)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية (المغطاة بالأعشاب البحرية)  
والوحلة ، عند أعماق تتراوح بين 15 و 100 متر .

الغذاء : القشريات والقواقع البحرية .


موسم التكاثر : شهر النّوَّار (فبراير) - الماء (مايو) .

الحجم : 15 - 20 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : CENTRACANTHIDAE

عائلة : سينتراكانثيدي



الإسم المحلي : الزُّيْقَةُ

الإسم العلمي : سبيكارا مينا

*Spicara maena*

الإسم الإنجليزي : بلوتشيد بيكاريل

*Blotched picarel*

## الزُرِّيْقَةُ

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية (المغطاة بالأعشاب البحرية)  
والوحلة عند أعماق تصل إلى 100 متر .

الغذاء : القشريات والقواقع البحرية .

موسم التكاثر : أشهر هانيبال (أغسطس) - التمور (أكتوبر) .

الحجم : 20 - 25 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : BRAMIDAE

عائلة : براميدي



الإسم المحلي : الكَسْتَنَائِيَّة (قَصْطَلَة)

الإسم العلمي : براما براما

*Brama brama*

الإسم الإنجليزي : أطلنطيك بومفريت

*Atlantic pomfret*

## الكَسْتَنَائِيَّةُ (قَصْطَلَّة)

المعيشة : عائمة بالمياه الدافئة عند أعماق تتراوح بين 20 و 100 متر .

الغذاء : الأسماك الصغيرة ، والرخويات (السيبيا والأخطبوط) .


موسم التكاثر : شهرا هانيبال (أغسطس) و الفاتح (سبتمبر) .

الحجم : 40 - 70 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY: LUVARIDAE

عائلة : لوفاريدي



الإسم المحلي : الكُوَّة (الامبراطور)

الإسم العلمي : لوفارس إمبريالي

*Luvarus imperialis*

الإسم الإنجليزي : لوفار

*Luvar*

## الكُوَّة (الامبراطور)

المعيشة : أسماك قاعية ، تعيش بالمياه العميقة ، عند أعماق تصل إلى 200 متر .

الغذاء : القشريات والهوائم الحيوانية والنباتية .

موسم التكاثر : فصلا الربيع والصيف .

الحجم : 60 - 152 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .



FAMILY : SOLEIDAE

عائلة : سوليدي



الإسم المحلي : سَمَكْ مُوسَى (مَداس)

الإسم العلمي : سوليافولقارس

*Solea vulgaris*

الإسم الإنجليزي : كومون صول

*Common sole*

## سَمَكٌ مُوسَى (مَدَاسُ)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 200 متر .

الغذاء : القواقع الصغيرة ، الديدان البحرية والقشريات .


موسم التكاثر : أشهر أيّ النار (يناير) - الطير (أبريل) .

الحجم : 25 - 70 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : SOLEIDAE

عائلة : سوليدي



الإسم المحلي : سَمَكُ مُوسَى (مَدَّاس)

الإسم العلمي : سوليا لاسكارس

*Solea lascaris*

الإسم الإنجليزي : ساند صول

*Sand sole*

## سَمَكٌ مُوسَى (مَدَاسُ)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة ، عند أعماق تتراوح بين 5 و 350 متراً .

الغذاء : القواقع الصغيرة ، الديدان البحرية والقشريات .


موسم التكاثر : أشهر الماء (مايو) - الفاتح (سبتمبر) .

الحجم : 15 - 140 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : SOLEIDAE

عائلة : سوليدي



الإسم المحلي : سمك موسى (مداس)

الإسم العلمي : ميكروكيرس قاريقاتس

*Microchirus variegatus*

الإسم الإنجليزي : ثيكباك صول

*Thickback sole*

## **سمك موسى (مداس)**

**المعيشة :** قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 80 و 400 متر .

**الغذاء :** القواقع الصغيرة ، الديدان البحرية والقشريات .


**موسم التكاثر :** فصلا الربيع والصيف .

**الحجم :** 12 - 20 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف .

FAMILY : SOLEIDAE

عائلة : سوليدي



الإسم المحلي : سَمَكْ مُوسَى (مداس)

الإسم العلمي : ديكولوجلوسا كُنَيَاتَا

*Dicologlossa cuneate*

الإسم الإنجليزي : ويدج صول

*Wedge sole*

## سَمَكٌ مُوسَى (مَدَاس)

**المعيشة :** قاعية ، تعيش بالمياه الدافئة في المناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 10 و 100 متر .

**الغذاء :** القواقع الصغيرة والديدان البحرية والقشريات .

**موسم التكاثر :** أوائل الخريف وفصل الشتاء .

**الحجم :** 7 - 20 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف .



FAMILY : BOTHIDAE

عائلة : بوثيدي



الإسم المحلي : سَمَكْ مُوسَى (مَداس)

الإسم العلمي : أرنوغلوسوس كيسلري

*Arnoglossus kessleri*

الإسم الإنجليزي :

## سَمَكٌ مُوسَى (مَدَاسُ)

**المعيشة :** قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة ، عند أعماق تتراوح بين 5 و 300 متر .

**الغذاء :** القواقع الصغيرة والديدان البحرية والقشريات .


**موسم التكاثر :** أشهر الماء (مايو) - هانيبال (أغسطس) .

**الحجم :** 8 - 45 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف .

FAMILY : BOTHIDAE

عائلة : بوثيدي



الإسم المحلي : سَمَكُ مُوسَى (مَداس)

الإسم العلمي : أرنوغلوسوس لاتيرنا

*Arnoglossus laterna*

الإسم الإنجليزي : سكالد فيش

*Scaldfish*

## سَمَكٌ مُوسَى (مَدَاسُ)

**المعيشة :** قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 200 متر .

**الغذاء :** اللافقاريات ويرقات الأسماك .

**موسم التكاثر :** أشهر الطير (أبريل) - هانيبال (أغسطس) .

**الحجم :** 5 - 20 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف .

FAMILY : SCOPHTHALMIDAE

عائلة : سكوفثالميدي



الإسم المحلي : سَمَكْ مُوسَى (مَداس)

الإسم العلمي : لييدورهمبس بوسكي

*Lepidorhombus boscii*

الإسم الإنجليزي : فورسبوتيد ميقريم

*Four-spotted megrim*

## سَمَكٌ مُوسَى (مَدَاسُ)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والوحلة عند أعماق تصل إلى 700 متر .

الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : أشهر المريخ (مارس) - الصيف (يونيو) .

الحجم : 10 - 40 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : SCOPHTHALMIDAE

عائلة : سكوفثالميدي



الإسم المحلي : سَمَكْ مُوسَى (مداس)

الإسم العلمي : لبيدورهمبس ويفيافونس

*Lepidorhombus whiffiagonis*

الإسم الإنجليزي : ميقرم

*Megrim*

## سَمَكٌ مُوسَى (مدّاس)

**المعيشة :** قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 400 متر .

**الغذاء :** القشريات ويرقات الأسماك .

**موسم التكاثر :** أشهر المربّخ (مارس) - الصيف (يونيو) .


**الحجم :** 20 - 60 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف .



FAMILY : SCOPHTHALMIDAE

عائلة : سكوفثالميدي



الإسم المحلي : سَمَكْ مُوسَى / تَرْبُوتْ (مداس)

الإسم العلمي : بَسِيْتَا مَأكْسِيْمَا

*Psetta maxima*

الإسم الإنجليزي : تربوت

*Turbot*

## سَمَكٌ مُوسَى / تَرَبُّوتٌ (مداس)

**المعيشة :** قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 70 متراً .

**الغذاء :** القشريات و القواقع البحرية ويرقات الأسماك .

**موسم التكاثر :** أشهر الطير (إبريل) - هانيبال (أغسطس) .

**الحجم :** 40 - 100 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف .

FAMILY: MURAENIDAE

عائلة : مورانيدي



الإسم المحلي : ثَعْبَانُ الْبَحْرِ (زَمْرِينَة)

الإسم العلمي : مورينا هيلينا

*Muraena helena*

الإسم الإنجليزي : ميدترانيان موري

*Mediterranean moray*

## ثَغْبَانُ الْبَحْرِ (زَمْرِينَةُ)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية المغطاة بالطحالب والأعشاب البحرية القريبة من الشواطئ والسواحل .

الغذاء : الرخويات (السيبيا والأخطبوط) والأسماك .

موسم التكاثر : فصل الصيف ؛ أشهر الصيف (يونيو) - هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 20 - 130 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، الشباك الخيشومية ، الخيط بالصنار ، والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : ANGULLIDAE

عائلة : أنقوليدي



الإسم المحلي : نُعْبَانُ الْمَاءِ (أنقويلاً)

الإسم العلمي : أنقويلاً أنقويلاً

*Anguilla anguilla*

الإسم الإنجليزي : إيل

*Eel*

## تُغْبَانُ الْمَاءُ (أُنْقَوِيلاً)

**المعيشة :** أسماك قاعية ، مهاجرة ؛ وتعيش بالمياه العذبة والضحلة (البحيرات) .

**الغذاء :** الهوائم الحيوانية ، القشريات ويرقات الأسماك .

**موسم التكاثر :** فصلا الشتاء والربيع .

**الحجم :** 30 – 100 سم .

**طرق الصيد :** الخيط الطويل (البرنقالي) ، الشباك الخيشومية ، وشباك الجرف .

FAMILY : CONGRIDAE

عائلة : كونقريدي



الإسم المحلي : الجُرَيْثُ (قَرْنَقُو)

الإسم العلمي : كونقر كونقر

*Conger conger*

الإسم الإنجليزي : أوربيّان كونقر

*European conger*

## الجُرَيْثُ (قَرْنَقُو)

**المعيشة :** أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية ، عند أعماق تتراوح بين 5 و 155 متراً .

**الغذاء :** الرخويات (السيبيا والأخطبوط)، القشريات والأسماك .

**موسم التكاثر :** فصل الصيف ؛ أشهر الصيف (يونيو) - هانيبال (أغسطس) .

**الحجم :** 20 - 300 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف ، الشباك الخيشومية . الخيط بالصنار ، والخيط الطويل (البرنقالي) .



FAMILY : TRIAKIDAE

عائلة : ترياكيدي



الإسم المحلي : القرش الثوب (كلب البحر)

الإسم العلمي : قاليورھينس قاليوس

*Galeorhinus galeus*

الإسم الإنجليزي : توب شارك

*Tope shark*

## **القرش الثوب (كلب البحر)**

**المعيشة :** أسماك عائمة بالمياه العليا القريبة من الشواطئ .

**الغذاء :** الأسماك و الرخويات (السيبيا والأخطبوط) .

**موسم التكاثر :** فصلا الشتاء والربيع .

**الحجم :** 50 – 200 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف ، و الخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SQUALIDAE

عائلة : سكواليدي



الإسم المحلي : القرش المَهْمَازي (كلب البحر)

الإسم العلمي : سكوالس أكانثياس

*Squalus acanthias*

الإسم الإنجليزي : سبيردوق

*Spurdog*

## القرش المَهْمَازي (كلب البحر)

**المعيشة :** أسماك قاعية مهاجرة وعائمة ، تعيش عند أعماق تتراوح بين 10 و 200 متر .

**الغذاء :** اللافقاريات ، (الرخويات) ، والأسماك .


**موسم التكاثر :** فصلا الشتاء والربيع .

**الحجم :** 75 - 300 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والخيوط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : LAMNIDAE

عائلة : لامنيدي



الإسم المحلي : القرش قصير الزعنفة / مأكو (كلب البحر)

الإسم العلمي : أزيورس أوكسيرنكاس

*Isurus oxyrinchus*

الإسم الإنجليزي : شورتفين مأكو

*Shortfin mako*

## القرشُ قصيرُ الزُعْنَفَة / مأكُو (كلب البحر)

**المعيشة :** أسماك عائمة وقاعية ، تعيش عند أعماق تصل إلى 400 متر .

**الغذاء :** الأسماك العائمة (السردين ، الأنشوجة) والرخويات (السيبيا والاختبوط) .

**موسم التكاثر :**

**الحجم :** 3 - 4 أمتار .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والخيوط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SCYLITORHINIDAE

عائلة : سكيلورهيندي



الإسم المحلي : القرش دقيق الترقيط (كلب البحر)

الإسم العلمي : سكيلورهيئس كانيكولا

*Scyliorhinus canicula*

الإسم الإنجليزي : سمولسبوتد كاتشارك

*Smallspotted catshark*

## **القرش دَقِيقُ التَرْقِيط (كلب البحر)**

**المعيشة :** أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 400 متر .

**الغذاء :** الأسماك ، القشريات والقواقع البحرية .

**موسم التكاثر :** أشهر الحرث (نوفمبر) - ناصر (يوليو) .

**الحجم :** 20 - 100 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والخيوط الطويل (البرنقالي) .



FAMILY : SQUATHINIDAE

عائلة : سكواثينيدي



الإسم المحلي : القرش الملاك (السفن)

الإسم العلمي : سكواتينا سكواتينا

*Squatina squatina*

الإسم الإنجليزي : إينجل شارك

*Angelshark*

## القرش الملاك (السفن)

**المعيشة :** أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 5 و 100 متر .

**الغذاء :** الأسماك ، القشريات والقواقع البحرية .

**موسم التكاثر :** أشهر الكانون (ديسمبر) - النوار (فبراير) .

**الحجم :** 50 - 250 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف والخيوط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : RAJIDAE

عائلة : راجيدي



الإسم المحلي : الرّايّة (شائكة الظهر)

الإسم العلمي : رايّا كلافتا

*Raja clavata*

الإسم الإنجليزي : ثورنباك راي

*Thornback ray*

## الرأية (شائكة الظهر)

**المعيشة :** أسماك قاعية تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 300 متر .

**الغذاء :** القشريات والكائنات البحرية الدقيقة .

**موسم التكاثر :** فصلا الشتاء والربيع .

**الحجم :** 20 - 90 سم .

**طرق الصيد :** شباك الجرف ، والشباك الخيشومية .